

- 本剤は緊急避妊薬であり、性交後72時間以内に服用する必要があります。
- ノルレボの販売については、研修を修了した薬剤師（以下、研修修了薬剤師とします）から説明を受け、服用希望者本人が研修修了薬剤師から本剤1錠を購入し、**面前で服用する**必要があります。
- 服用希望者の状況によって、**購入前に妊娠検査薬での検査**が必要になる場合や、ノルレボの購入ができない場合があります。

☐ 理解した

販売店に行く前に、本剤を服用できる可能性があるかを確認するため、以下のフローチャートに従って✓してください。 ※販売店でチェックすることも可能です。

チェック

①

- ☐ 服用希望者本人（女性）が来店し服用する
- ☐ 性交後72時間以内である
[妊娠が心配な性交の日時]

年 月 日 AM・PM 時 分頃

☐ 2項目とも該当する☐ 該当しない
項目がある

チェック

②

- ☐ これまでに緊急避妊薬などのレボノルゲストレルを含む医薬品を服用してアレルギー症状が出たことがある

☐ 該当しない☐ 該当する

チェック

③

- ☐ 「肝臓病」の診断を受けている
- ☐ 現在、妊娠している

☐ 該当する項目がない☐ 該当する
項目がある

ノルレボを服用できる可能性があります。以下の質問にお進みください

チェック

④

- ☐ 現在授乳中である

☐ 該当する チェック⑤へ☐ 該当しない
チェック⑥へ

チェック

⑤

- ☐ 本剤を服用後、少なくとも24時間は授乳を避ける

☐ 同意する☐ 同意しない

チェック

⑥

- ☐ 医師の治療を受けている
医療機関の受診状況
(疾患名：)
医療機関で処方されている薬剤がありますか
☐ いいえ ☐ はい(薬剤名：)
- ☐ 「心臓病」の診断を受けている
- ☐ 「腎臓病」の診断を受けている
- ☐ 食物や薬の吸収を妨げる重度の「消化器疾患」の診断を受けている
- ☐ いままで薬などによりアレルギー症状が出たことがある
(アレルギーの原因：)
(症状：)
- ☐ セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む食品を摂取している
- ☐ 常用している医薬品がある
(薬剤名：)
- ☐ 常用している健康食品がある
(食品名：)

☐ 該当する項目がない☐ 該当する
項目がある

本剤を
服用することは
できません

医療機関を
受診して
ください

※ワンストップ支援センターの情報、
医療機関検索サイトについて、
チェックシート〈その2〉に掲載して
いますのでご参照ください。

本剤を服用する
ことはできません

本剤を
服用できない
可能性があります

研修修了薬剤師に
相談してください

☐ 相談の結果、
服用できる可能性あり
※店舗で研修修了薬剤師が確認

裏面にお進みください

すでに妊娠されていないかを確認するため、以下の内容についてお答えください。

直近の 月経(生理)に ついて	● <u>月経(生理)周期</u> ☐ 整(日) ☐ 不整(およそ 日～ 日) ☐ わからない ☐ 出産や流産、中絶後で月経(生理)が再開していない ● <u>直近の月経(生理)の開始日</u> 年 月 日 ☐ わからない ● <u>出血量と期間について、通常の月経(生理)と比較して</u> ※()内は該当する方に○を付ける ☐ 出血量が(少なかった・多かった) ☐ 月経(生理)期間が(短かった・長かった) ☐ 変わらない
これまでの 性交について	● <u>3週間以上前*</u>に性交が ☐ なかった ☐ あった *直近の月経(生理)のひとつ前の月経(生理)よりも前の性交は含みません ● <u>3週間以内に、今回の性交以外の性交が</u> ☐ なかった ☐ あった ● <u>直近の月経(生理)以降、今回よりも前に妊娠が心配な性交が</u> ☐ なかった ☐ あった

以下の注意をご確認ください

- 本剤の服用により完全に妊娠が防止できるわけではありません。妊娠を防ぐ確率（妊娠阻止率）は81%でした。
 - 本剤の服用後も、妊娠する可能性があるので、適切な方法での避妊が必要です。
 - 性交前に本剤を服用しても妊娠の回避はできません。
 - 本剤が効いたかどうかは、服用後すぐにわかるわけではありません。
- 服用して3週間後に妊娠検査薬の使用または医療機関の受診により妊娠の有無を確認してください。
- 妊娠検査薬での確認の結果、陽性の場合はできるだけ早く医療機関を受診してください。
- 服用後、2時間以内に嘔吐した場合は、医療機関を受診してください。
 - 服用後に以下がみられた場合は医師または薬剤師にご相談いただくか、医療機関を受診してください。
- 本剤の効果が不十分、妊娠している、副作用が出ている等のおそれがあります。

月経(生理)時・妊娠初期にみられる症状が7日以上続く (出血、頭痛、吐き気、倦怠感、眠くなるなど)
月経(生理)が、予定される時期*から7日以上来ない
月経(生理)が、予定される時期*よりも早く来たり、出血量がいつもと違う
ふせいせいきしゅつけつ 不正性器出血(月経時以外の性器からの出血)、下腹部の痛みがある

*本剤を服用する前の直近の月経がはじまった日からおよそ1か月後(28日周期の場合)

- 本剤のリスクではありませんが、一般的に妊娠のうち、1%～2%の確率で異所性妊娠が起こる可能性があり、異所性妊娠であった場合、急速かつ致命的な転帰をとることがあります。異所性妊娠かどうかは医療機関を受診しないとわからないため、妊娠が心配な場合は速やかに医療機関を受診してください。
- この他にも少しでも気になることがある場合は、ためらわずに医療機関を受診してください。

☐ **注意を確認しました**

情報提供の必要性を確認するため、下記について教えてください。

年齢について	● <u>16歳未満である</u>		☐ はい	☐ いいえ
その他	● <u>緊急避妊薬を使用したことはありますか</u>			
	☐ はい [服用回数()回、直近の服用時期(年 月頃)]		☐ はい	☐ いいえ
	● <u>3週間後、日本に居住又は滞在していますか</u>		☐ はい	☐ いいえ
その他に気になることがあればご記入ください				

●医療機関の検索はこちら

婦人科・産婦人科施設検索は、ウィメンズヘルスケアサービス「ルナルナ」が運用管理しています。

また、「ルナルナ」アプリ内からもご利用いただけます。



<https://medicopt.lnln.jp/clinic>

●ワンストップ支援センターでのご相談が可能です。

※ワンストップ支援センターは、性犯罪・性暴力に関する相談窓口です。
産婦人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門機関とも連携しています。
全国共通の電話番号、又はホームページに記載の最寄りのワンストップ支援センターの電話番号にお電話ください。



https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html

電話番号
#8891