

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

緊急避妊薬

要指導医薬品

ノルレボ[®]

製品の特徴

- ・ノルレボ[®]は、女性が服用する緊急避妊薬です。
- ・緊急避妊薬は、あなたが、避妊をしないで性交してしまった、またはコンドームが破けてしまったなど避妊に失敗した場合に、妊娠を防止するために服用するお薬です。
- ・本剤の服用により、完全に妊娠が防止できるわけではありません。**服用して3週間後に妊娠検査薬の使用または医療機関の受診により妊娠の有無を確認**してください。
妊娠検査薬での確認の結果、陽性の場合にはできるだけ早く医療機関を受診してください。
- ・性交を行う前に本剤を服用しても妊娠を防止することはできません。
- ・ノルレボ[®]は、性交後**72時間以内に服用**する必要があります。
- ・研修修了薬剤師から、本剤服用前の確認、服用後の注意事項について説明を受けたのちに、**本剤1錠を購入し、研修修了薬剤師の面前で服用**してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の診断を受けた人
肝臓病
 - 妊婦
 - 男性
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤服用後、少なくとも24時間は授乳を避けてください。



相談すること

- 次の人は服用前に薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の診断を受けた人
 - 心臓病
 - 腎臓病
 - 食物や薬の吸収を妨げる重度の消化器疾患
 - セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）*を含む食品を摂取している人
*ヨーロッパおよびアジアが原産のオトギリソウ科の多年草で山野に自生。エキ스는ドイツでは抗うつ薬として使用され、日本では、健康補助食品として販売されています。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、下腹部痛、下痢、腹痛
精神神経系	頭痛、眠気、めまい、不安
生殖器	不正性器出血、月経異常（月経過多、月経遅延）
その他	貧血、倦怠感・疲労、浮遊感、口のかわき、熱感、手足のむくみ、乳房圧痛（乳房を押したり触ったりして生じる痛み）

- 服用後、次のような症状がみられた場合は、妊娠等の可能性があるので、この説明文書を持って、速やかに医師または薬剤師に相談してください。
 - 月経（生理）が、予定される時期**から7日以上来ない場合
 - 月経（生理）のような出血や、頭痛、吐き気、倦怠感、眠くなるなどの月経（生理）時・妊娠初期にみられる症状が7日以上続く場合
 - 月経（生理）が、予定される時期**よりも早く来たり、出血量がいつもと違う場合

** 本剤を服用する前の直近の月経（生理）が始まった日からおよそ1か月後（28日周期の場合）



その他の注意

1. 本剤の服用前に、すでに妊娠が成立している場合には、本剤の効果はありません。
妊娠している女性は服用しないでください。
2. 本剤は性交後に、緊急的に妊娠を防止するためのものです。
本剤を服用した後も妊娠する可能性がありますので、計画的に避妊する場合は、低用量経口避妊薬の継続使用など避妊効果の高い方法で避妊してください。
3. 本剤が効いたかどうかは、服用後すぐにわかるわけではありません。服用して3週間後に妊娠検査薬の使用または医療機関の受診により妊娠の有無を確認してください。
妊娠検査薬での確認の結果、陽性の場合はできるだけ早く医療機関を受診してください。

効能・効果

緊急避妊

<効能・効果に関連する注意>

- (1) 本剤の服用により、完全に妊娠が防止できるわけではありません。
- (2) 本剤は避妊をしない性交や避妊に失敗した性交が行われた場合に妊娠を防止するものであり、性交を行う前に本剤を服用しても妊娠を防止することはできません。
- (3) 本剤を服用した後も妊娠する可能性がありますので、適切な避妊を行ってください。

用法・用量

性交後72時間以内に本剤1錠を薬剤師から受け取り、その場で服用する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。必要となった場合には、なるべく早く本剤を服用してください。
- (2) 服用前に薬剤師から、本剤服用前の確認、服用後の注意事項について説明を受けてください。
- (3) 錠剤の取り出し方
錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)。

おしだす



成分・分量

1錠中

成分	分量	はたらき
レボノルゲストレル	1.5mg	排卵を抑える、受精を妨げる、子宮への受精卵の着床を阻止することで、妊娠を阻止すると考えられています。

添加物：乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

保管及び取扱い上の注意

- (1) 外箱とこの説明文書を大切に保管してください。
- (2) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01 登録商標



製造販売元
あすか製薬株式会社
東京都港区芝浦二丁目5番1号



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10